

NIKOMEX

100 mq / 2ml №10 ampul
ə/d və v/d inyeksiya üçün məhlul

Nikomeks əzələdaxili və venadaxili infuziya şəklində (şırnaq, damcı) yeridilir. Dozalar fərdi təyin olunur. Venadaxili infuziya şəklində yerildikdə preparat 0,9%-li NaCl məhlulunda (200 ml) həll olunur. Müalicə böyüklerdə gündə 1-3 dəfə 50 - 100 mq-dan başlayır. Terapevtik effekt alınana qədər doza artırıla bilər. Nikomeks venadaxili şırnaq üsulu ilə 5-7 dəq ərzində yavaş, damcı üsulu ilə - dəqiqədə 40-60 damcı yeridilir. Maksimal sutkalıq doza 800 mq-dir.

Patologiya	Kurs dozası	Müalicə müddəti
Kəskin beyin qan dövranı pozulması	İlk 2-4 gün sutkada 1 dəfə 200 - 300 mq damcı və ya şırnaq üsulu ilə vena daxilinə, sonra sutkada 3 dəfə 100 mq əzələ daxilinə	10-14 gün
Kəllə - beyin travması və onun fəsadları	Vena daxilinə damcı üsulu ilə 200 - 500 mq gündə 2-4 dəfə yeridilir.	10-15 gün
Dissirkulyator ensefalopatiyanın dekompensasiya fazası	100 mq gündə 2-3 dəfə şırnaq v/d və ya damcı üsulu ilə v/d; Sonrakı 2 həftə ərzində ə/d 100 mq/sut yeridilir.	14 gün + 14 gün
Dissirkulyator ensefalopatiyanın profilaktikası	100 mq gündə 2 dəfə əzələ daxilinə	10-14 gün
Ahil yaşlı xəstələrdə yüngül koqnitiv pozulmaları və həyəcan halı	gündə 100 - 300 mq/sut dozada əzələ daxilinə	14-30 gün
Kəskin miokard infarktının kompleks terapiyası	İlkin 5 sutka ərzində kompleks terapiyada preparat venadaxilinə, sonrakı 9 sutka ərzində isə əzələdaxilinə gündə 3 dəfə hər 8 saatdan bir yeridilir. Sutkalıq terapevtik doza hər kq bədən çəkisində 6- 9 mq/kq, birdəfəlik doza hər kq bədən çəkisində 2-3 mq/kq təşkil edir. Maksimal sutkalıq doza 800 mq-dan, birdəfəlik doza 250 mq-dan artıq olmamalıdır	5 gün + 9 gün

İstifadəsinə göstərişlər

- Kəskin beyin qan dövranının pozulması
- Kəllə - beyin travması və onun fəsadları
- Dissirkulyator ensefalopatiya
- Vegetativ damar distoniyası sindromu
- Ateroskleroz mənşəli yüngül koqnitiv pozulmalar
- Nevrotik və nevrozabənzər vəziyyətlər
- Kəskin miokard infarktının kompleks terapiyası (ilk sutkadan)
- İlkin açıqbucaqlı qlaukomanın müxtəlif mərhələlərinin kompleks terapiyası
- Alkoqolizmin nevrozabənzər və vegetativ - damar dəyişikliyi ilə keçən abstinent sindromu aradan qaldırmaq məqsədilə
- Antipsixotik vasitərlə kəskin intoksikasiya
- Qarın boşluğunun kəskin irinli - iltihabi proseslərinin kompleks terapiyası (kəskin nekrotik pankreatit, peritonit)



Əks göstərişləri: Kəskin qaraciyer və böyrək çatışmazlığı. Preparata qarşı yüksək həssaslıq.

Hamiləlik və laktasiya dövrü, uşaqlarda istifadəsi.

Əlavə təsirləri: Ürəkbulanma və ağız boşluğunun quruluğu, yuxululuq, allergik reaksiya, emosional reaktivlik, qorxu hissi, distal hiperhidroz, başağrısı, koordinasiya pozğunluğu, yüksək və aşağı arterial təzyiq müşahidə oluna bilər.

Buraxılış forması:

2 ml, işqından qoruyan şüə ampulda, №10 (5x2), karton qutuda blister qablaşma.



Nikopharm, Ukrayna

NIKOMEX 2

Etilmetilhidroksipiridin suksinat 100 mq / 2 ml

Antioksidant, antihipoksant, membranoprotektor

SEREBROPROTEKTOR

ANTİAQREQANT


ANKSİOLİTİK

ADAPTOGEN

NOOTROP



100 mq / 2ml №10 ampul



Kəskin və xroniki beyin qan dövranının pozulması

İşemiya əleyhinə təsir

İşemiya
sahəsini kiçildir

Qan dövranını
yaxşılaşdırır

Reparativ
prosesləri
tənzimləyir