

ecOFUCIN

Natamycin 100 mq

Tərkibi (1 vaginal suppozitoriya):

Natamisin - 100 mq

Laktuloza - 300 mq

Üstünlüklər:

- Daha güvənli *C.albicans* eradikasiyasını və normal mikrofloranın bərpasını təmin edir
- Daha tez, maksimal və təhlükəsiz kliniki effekt - **Hamiləliyin ilk trimestrindən kəskin VVK zamanı istifadəsinə göstəriş.**
- Tərkibində prebiotik laktulozanın olması - **Daha çox Laktobakteriya ştammları sayının artması hesabına:**
 - residivlərin azalması,
 - normal - fizioloji gedişatlı hamiləlik və doğuş,
 - yenidoğulmuşlarda MBT-nin biosenozunun, immun homeostazının formalaşması baş verir.
- **6 günlük terapiya kursunun nəticəsində servikal kanalda laktobakteriyaların miqdarı 50 dəfə artmışdır.** ↑

Экофуцин® – первый препарат для эрадикации грибов рода Candida с эффектом стимуляции роста лактобацилл у беременных женщин
Профессор Кузьмин В.Н., Богданова М.Н. ФГБОУ ВО МГМСУ им А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия



Farmakodinamikası (Natamisin):

- Polien qrupundan olan göbəkəleyhinə preparatdır.
- Geniş təsir spektrinə malikdir. Funqisid təsir göstərir.
- Natamisin hüceyrə membranlarının sterolları ilə geridönməz şəkildə birləşərək, onların təmliğini və funksiyalarını pozur və bu, mikroorqanizmlərin məhvini gətirib çıxarır.
- Əksər patogen maya göbəkələri, xüsusilə *Candida albicans*, həmçinin, *Torulopsis*, *Rhodotorula*, *Aspergillus*, *Penicillium* və dermatofitlər (*Trichophyton*, *Microsporum*, *Epidermophyton*) natamisinə qarşı həssasdır.
- Klinik təcrübədə Natamisinə qarşı rezistentlik rast gəlinmir.
- *In vitro* qrammüsbət və qrammənfi bakteriyalara təsir göstərmir.

Farmakokinetikası:

Natamisin sistem təsir göstərmir → praktiki olaraq selikli qişa səthindən sorulmur.
Qaraciyər və böyrək patologiyası olan pasiyentlərə tam təhlükəsizdir



İstifadəsinə göstərişlər:

CANDIDA ALBICANS
göbəkələri tərəfindən törədilən:

- VAGİNİTLƏR
- VULVİTLƏR
- VULVOVAGİNİTLƏR

İstifadə qaydası və dozası:
1 supp. x 1 dəfə uşaqlıq yoluna



ecOFUCIN

Natamycin 100 mq

Vaginal suppozitoriya **N6**

• Maksimum təhlükəsizlik



HAMILƏLİYİN İLK GÜNÜNDƏN
VƏ LAKTASIYA PERİODUNDA
RAHATLIQLA TƏYİN EDİLİR

- Sinergist vəhdət
- Tez kliniki effekt



Natamisin + Prebiotik

Candida göbəkəllərinin
eradikasiyası

Fizioloji mikrofloranın
bərpası



Qadınlarda vulvovaginal kandidozların yaranma səbəbi

85-90% hallarda C.albicans-dir

75%

Qadınlarda reproduktiv dövründə həyatı boyu ən azı VVK*-un 1 epizodu rastlanır

50%

Qadınlarda təkrari VVK* epizodları olur

5%

Qadınlarda VVK*-un residivlərindən əziyyət çəkir

*VVK - vulvovaginal kandidoz



HAMİLƏLİK və VVK

- RASTGƏLMƏ TEZLİYİ - 40-46 %
- HESTASİYON MÜDDƏT ARTDIQCA PROGRESSİVLƏŞİR ↑
- DOĞUM SONRASI PERİODDA RASTGƏLMƏ TEZLİYİ KƏSKİN AZALIR ↓ 55-60%

<https://omnidocor.ru/upload/iblock/01e/01e11e0e77160a25235ad0d535cd7705.pdf>

Hamilə qadınlarda Vulvovaginal Kandidozlar 3 dəfə daha artıq rast gəlinir!

- HAMİLƏLƏRİN ORQANİZMİNDƏ BAŞ VERƏN HORMONAL DƏYİŞİKLİKLƏR
- ESTROGENLƏRİN ARTMASI İLƏ MÜŞAHİDƏ OLUNAN EPİTELİAL HÜCEYRƏLƏRDƏ QLIKOGENİN TOPLANMASI
- YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ PROGESTERONUN İMMUNOSUPRESSİV TƏSİRİ VƏ QAN SERUMUNDA ALFA-2-QLOBULİN İLƏ ƏLAQƏLİ İMMUNOSUPRESSOR AMİLİN OLMASI
- HAMİLƏLİYƏ QƏDƏR HORMONAL STATUSUN DƏYİŞMƏSİ (ORAL KONTRASEPTİVLƏRİN QƏBULU, ŞƏKƏRLİ DIABET - HESTASİYON)
- HAMİLƏLİYİN GEDİŞATI VƏ MÜDDƏTİ • YAŞ, SOSİAL STATUS
- MİKROBİOSENÖZUN DƏYİŞMƏSİ (DİSBAKTİRİOZ, VİRAL VƏ BAKTERİAL İNFEKSİYALAR), HƏMÇİNİN, VAGİNADA pH-IN AŞAĞI OLMASI CANDİDA GÖBƏLƏKLƏRİNİN ADHEZİYASININ GÜCLƏNMƏSİNƏ KÖMƏK EDİR
- ANTİBAKTƏRİAL TERAPİYA VƏ ANEMİYA

https://journals.eco-vector.com/jowd/article/view/86951/ru_ru



Hamilələrdə VVK fəsadları:




- Hamiləliyin erkən pozulması- Düşüklər
- Xorioamnionit (dölyanı mayədə patoloji dəyişikliklər)
- Dölün hipoksiyası, azçəkili olması
- Doğuş yollarının yara infeksiyaları
- Doğuşdan sonrakı endometrit
- İntranatal (doğuş zamanı yenidoğulmuşlarda ağız boşluğu, anogenital bölgədə) yoluxma




Yeni doğulmuşlarda infeksiyon iltihabi xəstəliklərin 15,1-25,8%-i C.spp törədicilərindən qaynaqlanır

VVK zamanı ECOFUCIN < Tez zamanda kliniki və mikrobioloji remissiya Ən minimal residiv



Uşaqlıq yolunda kəsmiyəbənzər ifrazatın tezliyi



Uşaqlıq yolunda qaşınma və göynəmə əlamətlərinin tezliyi

Экофуцин® – первый препарат для эрадикации грибов рода Candida с эффектом стимуляции роста лактобацилл у беременных женщин
Профессор Кузьмин В.Н., Богданова М.Н. ФГБОУ ВО МГМСУ им А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия

Natamisin

- PRAKTİK OLARAQ QANA SORULMUR VƏ SİSTEM TƏSİRƏ MALİK DEYİL.
- FUNQİSİD TƏSİRƏ MALİKDİR - GÖBƏLƏK HÜCEYRƏLƏRİNİ MƏHV EDİR.
- REZİSTENTLİK YARATMIR.
- ŞƏRTİ PATOGEN MİKROFLORANIN İNKİŞAFINA MANE OLUR.

Laktuloza (Prebiotik)

- UŞAQLIĞIN NORMAL MİKROFLORASI İLƏ AKTİV FERMENTLƏŞƏRƏK LAKTOBAKTƏRİYALARIN BÖYÜMƏSİNƏ TƏKAN VERİR.
- UŞAQLIQ YOLUNUN MİKROFLORASINI BƏRPA EDİR, YERLİ İMMUNİTETİ STİMULƏ EDİR.

