

Ovunorm

Reproduktiv sağlamlığın və fertilliyin zəmini

- ✓ Menstrual tsikli və ovulyasiyanı bərpa edir⁹
- ✓ İnsulinə qarşı həssaslığı artırır
- ✓ Qlükoza tolerantlığın pozulmasını aradan qaldırır
- ✓ Lipidlərin səviyyəsini azaldır
- ✓ Hiperandrogenizmi aradan qaldırır



Tablet №30

1 tabletin tərkibi:

Mio-inozitol - 1000 mq	Koenzim Q10 - 20 mq
Alfa-lipoy turşusu - 50 mq	E vitamini - 20 mq
Maka köklərinin ekstraktı - 10 mq	Sink - 5 mq

İstifadəsinə göstərişlər:

Yumurtalıqların hormonal-metabolik disfunksiyası zamanı qadın reproduktiv orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi:

- Yumurtalıqların polikistozu sindromu (YPKS)
- Yumurtalıqların tükənmə sindromu (YTS)
- Oliqo - və amenoreya, anovulyasiya
- Hiperandrogeniya sindromu
- Süni mayalanma (EKM) və inseminasiya mərhələsində hazırlıq dövrü



1 tablet 2 dəfə/gün yeməkdən sonra

Qəbul qaydası və müalicə müddəti həkim tərəfindən tənzimləna bilər

Ovunorm BFMQƏ-nin istifadəsi üzrə təlimatının qısaldılmış forması:

Tərkibi: 1 tabletdə - 1000 mq mio-inozitol, 50 mq alfa-lipoy turşusu, 10 mq Maka (*Lepidium meyenii*) köklərinin quru ekstraktı, 20 mq koenzim Q10, 20 mq E vitamini, 5 mq sink vardır. **Farmakoterapevtik qrupu:** qadın reproduktiv orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə. **Farmakoloji xüsusiyyətləri:** Ovunorm tərkibində olan komponentlərin xüsusiyyətləri, bioloji aktivliyi və spesifik təsir mexanizminə əsaslanaraq müxtəlif xəstəliklərin kompleks müalicəsində qadın cinsi orqanlarının fəaliyyətini və reproduktiv sağlamlığı yaxşılaşdıraraq köməkçi vasitə kimi istifadə edilir. Ovunorm hormonal balansın tənzimləyir, yumurtalıqların funksional vəziyyətini yaxşılaşdırır, menstrual tsikli normallaşdırır və müntəzəm ovulyasiyanı bərpa edir, sağlam follikulların inkişafını və oositlərin keyfiyyətini təmin edir, hamiləlik ehtimalını artırır. Ovunorm yumurtalıqların polikistozu sindromu (YPKS) olan xəstələrdə oksidləşdirici stressi azaldır, insulini və homosistein səviyyələrini azaldır, hormonal-metabolik disfunksiyaları aradan qaldırır, yumurtalıqların həcmi azaldır və normal fəaliyyətini bərpa edir, fertilliyi artırır. Süni mayalanma və inseminasiyaya hazırlıq mərhələsində ovulyasiyanı stimula edir, oositlərin keyfiyyətini artırır, mayalanmış yumurtahüceyrələrin endometriuma implantasiyasını təmin edir. **Əlavə təsirləri:** müşahidə olunmayıb. **Əks göstərişləri:** preparatın hər hansı komponentinə qarşı hiperhəssaslıq. **Xüsusi ehtiyat tədbirləri:** həkim təyinatı olmadan tövsiyə edilən sutkalıq dozani keçməyin. Ovunorm normal qidalanmanı əvəz etmir. Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin. **Buraxılış forması:** Ovunorm, №30 tablet. 2 blister (15x2) içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuda qablaşdırılır. **Saxlanma şəraiti:** 25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, quru, işıqdan qorunan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. **İstehsalçı:** ValueMed Pharma S.r.L., San Marino (İtaliya).

BFMQƏ haqqında tam məlumat qablaşdırma qablaşdırma olan təlimatından əldə edilə bilər

1,3. Williams T. et al. Diagnosis and Treatment of Polycystic Ovary Syndrome. *Am Fam Physician*. 2016 Jul 15;94(2):106-113.
2,4,5,6,7. Lucidi R.S. et al. Polycystic Ovarian Syndrome. (Updated: Sep 19, 2019) In: *Drugs and Diseases*; Medscape: 1994-2016 by WebMD LLC. [Internet]. [cited 2021 Feb 10] Available: <https://emedicine.medscape.com/article/256806-overview#a5>
8. Regodar A. et al. Myoinositol as a Safe and Alternative Approach in the Treatment of Infertile PCOS Women: A German Observational Study. *International Journal of Endocrinology*. Volume 2016, Article ID 9537632, 5 pages
9. Unfer et al., *Endocrinology & Metabolic Syndrome*. 2014, 3:3 DOI: 10.4172/2161-1017.1000136

Ovunorm

Mio-inositol, maca, α-lipoic acid, CoQ10, Vit E, Zn



Reproduktiv sağlamlığın
və fertilliyin zəmini

№30 tab

YPKS* - reproduktiv yaşda olan qadınların arasında ən çox yayılan endokrinopatiyadır¹

Müraciət edən qadınların
10%-də rast gəlinir²





İnsulinə rezistentlik - YPKS-nin yaranmasının əsas səbəbidir³

Rotterdam kriterilərinə əsasən YPKS diaqnozu
3 əsas əlamətin 2-si olduğda qoyulur⁴

- Ovulyator disfunksiya (oliqo-, amenoreya)
- Hiperandrogenizm
- Yumurtalıq polikistozu


Ovulyator disfunksiyanın (oliqo-, amenoreya) yaranma səbəbləri⁵



Ovunorm

Reproduktiv sağlamlığın
və fertilliyin zəmini

Hiperandrogenizmin yaranma səbəbi⁶



Hiperandrogenizm əlamətləri



Yumurtalıq polikistozu⁷

- ≥ 12 follikulların olması
- Ölçüləri - 2-9 mm və ya
- Yumurtalıqın həcmi - >10 ml


Ovunorm

Mio-inozitol (Ovunorm) YPKS olan qadınlarda hormonların səviyyəsini normalaşdırır.⁸

(Mio-inozitol YPKS olan qadınlarda sonsuzluğun müalicəsində təhlükəsiz və alternativ müalicə üsulu kimi: nəzarət olunan tədqiqatlar. Almaniya, 2016)

Xəstə sayı: YPKS olan 3602 qadın

Müalicə rejimi: Mio-inositol 2 q x 2 dəfə/gün 2-3 ay ərzində



Mio-inozitol (Ovunorm) menstrual tsikli normalaşdırır:

Testosteronu - 2,3 dəfə ↓

Progesteronu - 5,9 dəfə ↑

Hamiləlik baş verib - 545 qadında

*YPKS - Yumurtalıqların Polikistozu Sindromu